

Piqûre par une abeille/guêpe/frelon ou une araignée ou une tique

Dr Denis

Février 2014

Si vous avez des difficultés à respirer, un gonflement du visage, une sensation de malaise, composez immédiatement le 15.

1 PIQÛRE D'ABEILLE, DE GUÊPE OU DE FRELON

En cas de piqûre d'abeille, il faut retirer l'aiguillon rapidement, et avec précaution. L'aiguillon est barbelé chez l'abeille, alors qu'il est lisse chez la guêpe et le frelon. En cas de piqûre de guêpe ou de frelon, l'aiguillon ne reste pas dans le derme et vous ne le trouverez pas.

Si la peau est normale, c'est que l'insecte n'a pas injecté de venin et il ne se passera rien.

Dans les autres cas, lavez avec de l'eau et du savon. Mettez une compresse imbibée d'alcool ou appliquez de la glace enveloppée dans un tissu. Prenez un médicament anti-douleur.

Si vous êtes allergique, allez chercher votre trousse ANAHELP, et appelez un médecin sans retard.

Si vous en disposez, et quelque soit la situation, vous pouvez prendre sans risque un antihistaminique (cétirizine, AERIUS par exemple). Si le membre gonfle, vous devez le surélever et consulter.

2 PIQÛRE D'ARAIGNÉE

Recherchez deux petits trous séparés de 1 millimètre. Si c'est le cas, c'est très certainement une piqûre d'araignée. Vous devez laver au savon, puis appliquer deux fois par jour un antiseptique à base de chlorhexidine. Consultez un médecin dans les 24 heures. Si vous en disposez, vous pouvez prendre sans risque un antihistaminique (cétirizine, AERIUS par exemple).

3 PIQÛRE DE TIQUE

Enlever la tique au moyen d'un tire-tique acheté en pharmacie. N'employez jamais autre chose qu'un tire-tique. Ne mettez aucun produit dessus, sauf de la glace pour l'endormir 15 minutes avant de l'enlever. Il faut tourner avec le tire-tique pour détacher le parasite.

Un antibiotique vous sera prescrit uniquement si la tique est restée attachée plus de 48 heures. Si vous avez retiré la tique avant 48 heures, vous n'avez pas de risque de maladie de Lyme, et vous n'avez pas besoin de consulter.

Si dans les 30 jours qui suivent une piqûre de tique vous remarquez une tâche rouge, vous devez impérativement consulter pour recevoir des antibiotiques.